

QU'EST-CE QU'UNE CRISE D'ÉPILEPSIE?

C'est la manifestation clinique d'une anomalie dans l'activité électrique du cerveau, comparable à un orage électrique.

L'intensité et les manifestations d'une crise sont variables suivant le type d'épilepsie (absence, mouvements musculaires anormaux...)

Les crises peuvent être:

- soit **partielles**, seulement une zone du cerveau est concernée,
- soit **généralisées**, tout le cerveau est touché.

350 000

C'est le nombre d'enfants suivis pour épilepsie en France.

2 500

C'est le nombre d'enfants amenés à être reçus au réseau DysÉpi.

800

C'est le nombre d'enfants suivis par le Réseau DysÉpi.

Réseau DysÉpi

Pavillon Sainte-Marie (4°)
CHU Saint-Jacques
25030 Besançon Cedex


03 81 21 84 29
dysepi@chu-besancon.fr
<http://dysepi.googlepages.com>

RAPPEL DE L'INJECTION DE VALIUM EN INTRA-RECTAL



Sortir le kit Valium®

En cas de doute, appeler le 15 ou le 112




Casser l'ampoule:
point bleu face à vous



Prélever la dose selon prescription (soit 1/2 ampoule ou 1 ampoule) avec la seringue et l'aiguille.




Laisser de l'air dans la seringue et retirer l'aiguille.



Insérer la canule sur la seringue

Document réalisé avec le soutien de [...bigbang.fr] - 2011

ATTENTION: si la crise s'est arrêtée, ne pas injecter le Valium®.



Introduire la canule dans l'anus de votre enfant et injecter le liquide rapidement. Si persistance des mouvements, appeler le 15 ou le 112.

Que faire devant une crise
d'épilepsie?

Réseau DysÉpi

Réseau régional des troubles des apprentissages et/ou de l'épilepsie de l'enfant et de l'adolescent.

Que faire face à une crise d'épilepsie ?

LES GESTES DE PREMIÈRE URGENCE

- **ALLONGER L'ENFANT PAR TERRE**
Pour éviter la chute.
- **APPELER LES SERVICES D'URGENCE**
Samu 15 ou 112 depuis votre portable en cas de doute ou si vous avez besoin de conseils.
- **SÉCURISER L'ENVIRONNEMENT**
Enlever tous les objets à proximité de l'enfant pour éviter qu'il se blesse.
- **NE RIEN METTRE DANS LA BOUCHE**
Il ne peut pas avaler sa langue.

L'INJECTION DE VALIUM® INTRA-RECTAL

**PRÉPARER
LE VALIUM® INTRA-RECTAL**
Voir au dos du document.

**SI LA CRISE S'EST ARRÊTÉE,
NE PAS FAIRE L'INJECTION
DE VALIUM® INTRA-RECTAL**
Le Valium® préparé se conserve quelques heures au frigo.

SI LA CRISE NE S'ARRÊTE PAS
Faire l'injection de Valium® en intra-rectal.

APRÈS LA CRISE D'ÉPILEPSIE

- **APRÈS LA CRISE**
Installer l'enfant sur le côté.
Il peut vomir, être confus et s'endormir.
Il peut perdre ses urines.
- **LES GESTES D'URGENCE FAITS**
Si la crise persiste malgré le Valium®, prévenir les services de secours: SAMU et/ou médecin traitant.
- **APRÈS LA CRISE**
Rester auprès de lui jusqu'à l'arrivée des secours.
- **SI L'ENFANT EST EN COLLECTIVITÉ**
Prévenir ses parents.